



# **INFORME CLIMATOLÓGICO**

## **VERÁN 2026**



## ÍNDICE

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                                | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>BALANCE DA TEMPERATURA E PRECIPITACIÓN NO VERÁN DE 2025.....</b>     | <b>4</b>  |
| 2.1.     | Temperatura .....                                                       | 4         |
| 2.2.     | Precipitación.....                                                      | 9         |
| <b>3</b> | <b>EVOLUCIÓN HISTÓRICA DA TEMPERATURA E PRECIPITACIÓN DE VERÁN.....</b> | <b>13</b> |
| 3.1.     | Temperatura .....                                                       | 13        |
| 3.2.     | Precipitación.....                                                      | 16        |
| <b>4</b> | <b>DIAGRAMA DE TERMOHIETAS.....</b>                                     | <b>18</b> |

**Data edición: 12/09/2026**

**Verán seco e o máis cálido desde 1961****1 INTRODUCCIÓN**

Este informe recolle unha descrición climatolóxica do verán de 2026, que engloba os meses de xuño, xullo e agosto. Para ilo, analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período climático de referencia **1981-2010**. Así, as anomalías calculadas nas táboas, mapas, gráficos e percentís contrástanse con respecto a este período de referencia.

| Percentil  | Temperatura (°C) | Precipitación (mm) |
|------------|------------------|--------------------|
| Min (0%)   | <b>18.1</b>      | <b>33</b>          |
| 20%        | 18.5             | 83                 |
| 40%        | 18.9             | 103                |
| 50%        | 19.0             | 121                |
| 60%        | 19.2             | 144                |
| 80%        | 19.8             | 168                |
| Max (100%) | <b>20.5</b>      | <b>210</b>         |

**Táboa 0.1:** Percentís de temperatura e precipitación medias da estación de verán para o período **1981-2010**.

O valor medio das series climatolóxicas dos trinta anos do período 1961-1990 e do período 1981-2010 denomínase **normal climatolóxica** e o seu uso permite establecer comparacións do tipo espacial entre distintas estacións e describir o estado climático de cada período. A utilización destes valores normais climatolóxicos serve, tamén, de referencia para valorar os comportamentos do clima e caracterizalos, ben en termos de frecuencia o en termos de anomalía, entendendo por **anomalía** a **diferenza entre o valor climatolóxico mensual o anual presentado e o normal**.

## Temperatura

Para a variable temperatura ( $T$ ), enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste verán e o valor climático obtido con respecto ao período de referencia 1981-2010. Para obter a anomalía de temperatura, calcúlanse a anomalía media nas once estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar a estación en función da temperatura, considéranse os seguintes criterios:

| Percentil                            | Categoría             |
|--------------------------------------|-----------------------|
| $T < T_{\min} 1981-2010$             | Extremadamente frío   |
| $T_{\min} 1981-2010 \leq T < P_{20}$ | Moi frío              |
| $P_{20} \leq T < P_{40}$             | Frío                  |
| $P_{40} \leq T \leq P_{60}$          | Normal                |
| $P_{60} < T \leq P_{80}$             | Cálido                |
| $P_{80} < T \leq T_{\max} 1981-2010$ | Moi cálido            |
| $T > T_{\max} 1981-2010$             | Extremadamente cálido |

Táboa 0.2. Cualificación da estación en función da temperatura

## Precipitación

Para a variable precipitación ( $PP$ ), enténdese por anomalía a porcentaxe da precipitación acumulada neste verán respecto do valor da media climática correspondente. Para obter a anomalía de precipitación, calcúlanse as anomalías medias nas dezaseis estacións meteorolóxicas que compoñen a serie rexional de Galicia.

Para caracterizar o mes en función da precipitación, considéranse os seguintes criterios:

| Percentil                              | Categoría             |
|----------------------------------------|-----------------------|
| $PP < PP_{\min} 1981-2010$             | Extremadamente seco   |
| $PP_{\min} 1981-2010 \leq PP < P_{20}$ | Moi seco              |
| $P_{20} \leq PP < P_{40}$              | Seco                  |
| $P_{40} \leq PP \leq P_{60}$           | Normal                |
| $P_{60} < PP \leq P_{80}$              | Húmido                |
| $P_{80} < PP \leq P_{\max} 1981-2010$  | Moi húmido            |
| $PP > PP_{\max} 1981-2010$             | Extremadamente húmido |

Táboa 0.3. Cualificación da estación en función da precipitación



## 2 BALANCE DA TEMPERATURA E PRECIPITACIÓN NO VERÁN DE 2025

### 2.1. Temperatura

O verán de 2026 foi **extremadamente cálido** e, cunha **temperatura media** de **21.4 °C** e unha **anomalía positiva** na temperatura media de **2.3 °C**, **o máis cálido da serie histórica**, que comeza en 1961, superando, deste xeito, ao verán de 2025. Tomando como referencia a media das temperaturas mínima e máxima, cuxas anomalías foron 2.0 e 2.6 °C, respectivamente, o verán foi, tamén, o máis cálido da serie de datos.


O verán comezou cun mes de **xuño** no que as temperaturas rexistradas estiveron moi por riba do que cabería agardar nun mes de xuño normal debido á frecuente chegada de masas de aire moi cálido desde o sur, sobresaíndo os episodios entre o 11 e o 14 e, sobre todo, entre o 20 e o 24. Así, o valor de **temperatura media** foi **20.4 °C**, o que representa unha **desviación positiva** de **2.6 °C**, resultando un mes **extremadamente cálido, o segundo máis cálido desde que comezou a serie de datos en 1961**. Do mesmo xeito, se tomamos como referencia a media da temperatura mínima, cun valor de 14.0 °C para a serie rexional e unha anomalía positiva de 2.0 °C, o mes resulta moi cálido, pasando a ocupar a cuarta posición na serie de datos, mentres que para a media da temperatura máxima, cun valor de 26.7 °C e unha desviación positiva 3.3 °C, o mes considérase o máis cálido da serie histórica.

No mes de **xullo**, as temperaturas, tanto as mínimas como as máximas, estiveron, en media, extremadamente por riba do agardado nun mes de xullo, debido ao predominio de tempo anticiclónico e a continua chegada de masas de aire cálido desde o sur. Deste xeito, a **temperatura media** acadou un valor de **22.5 °C**, o que representa unha **anomalía** de **2.8 °C**. Estes datos convierten a xullo de 2026 no **mes de xullo máis cálido desde que existen rexistros**. Se tomamos como referencia a media da temperatura mínima, cun valor de 15.9 °C para a serie rexional e unha anomalía positiva de 2.2 °C, o mes resulta, tamén, o máis cálido da serie histórica, mentres que para a media da temperatura máxima, cun valor de 29.0 °C e unha desviación positiva 3.5 °C, o mes considérase extremadamente cálido, pasando a ocupar a segunda posición na serie de datos.

O verán rematou cun mes de **agosto moi cálido, caracterizado** polas situacións anticiclónicas dos primeiros 20 días do mes, durante os cales destaca o episodio cálido vivido entre os días 10 e 18. Aínda así, a anomalía quedou bastante reducida polo episodio frío que se viviu entre as xornadas do 23 e o 29. Deste xeito, a **temperatura media** acadou


**21.4 °C**, o que significa unha **anomalía** positiva de **1.5 °C**. Tamén, foi moi cálido, o segundo máis cálido da serie de datos, para a temperatura mínima, cun valor medio de 15.7 °C y unha desviación positiva de 1.9 °C, e cálido para a temperatura máxima, con un valor medio de 27.1 °C e unha anomalía positiva de 1.1 °C.

Na **Figura 1**, móstrase o mapa de **temperatura media** para o verán de 2026. Segundo os valores do mapa, a temperatura media no conxunto da Comunidade foi 19.9 °C. Os valores máis altos movéronse entre 22.5 e 23.8 °C e localízanse na Depresión de Ourense e no val do río Sil. Pola contra, os rexistros máis baixos, de entre 16.2 e 17.4 °C, vémoslos, principalmente, na Serra de Queixa e nas Serras Setentrionais.



**Figura 1:** Temperatura media (°C) no verán de 2026.

Na **Figura 2**, pódese ver o mapa das **desviacións da temperatura media** respecto do valor de referencia no período 1981-2010. Segundo os valores do mapa, tratouse dun verán cunha anomalía media positiva de 2.7 °C. Os valores máis altos de anomalía da temperatura media localízanse, preferentemente, en diferentes áreas do extremo leste e sueste da Comunidade e superan os 3.5 °C. Os rexistros máis baixos oscilan entre 1.0 e 1.4 °C e atópanse na contorna das Rías de Arousa e de Pontevedra.



**Figura 2:** Anomalía da temperatura media (°C) no verán de 2026.



A continuación, móstranse, nas **Táboas 1 e 2**, as temperaturas máximas máis altas rexistradas na Comunidade galega na estación de verán de 2026 para estacións situadas por baixo e por riba dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Os días máis calorosos déronse a principios do mes de xullo, durante os primeiros vinte días de agosto, destacando o día 18, e, para estacións situadas a máis de 1000 metros de altitude, tamén, o 23 de xuño.

| Táboa 1: Temperatura <u>máxima máis alta</u> rexistrada no verán de 2026<br><u>por baixo</u> dos 1000 m de altitude |             |                          |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|---------|
| Data                                                                                                                | Estación    | Concello                 | Provincia  | TA (°C) |
| 04/07/2026                                                                                                          | Ourense     | OURENSE                  | Ourense    | 42.6    |
| 18/08/2026                                                                                                          | Remuíño     | ARNOIA (A)               | Ourense    | 42.4    |
| 06/07/2026                                                                                                          | San Clodio  | RIBAS DE SIL             | Lugo       | 42.3    |
| 18/08/2026                                                                                                          | EVEGA Leiro | LEIRO                    | Ourense    | 42.0    |
| 05/07/2026                                                                                                          | Boimorto    | BOIMORTO                 | A Coruña   | 41.9    |
| 04/07/2026                                                                                                          | Entenza     | SALCEDA DE CASELAS       | Pontevedra | 41.6    |
| 04/07/2026                                                                                                          | Cequeliños  | ARBO                     | Pontevedra | 41.6    |
| 05/07/2026                                                                                                          | Meder       | SALVATERRA DE MIÑO       | Pontevedra | 41.5    |
| 18/08/2026                                                                                                          | A Portela   | VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | Ourense    | 41.1    |
| 18/08/2026                                                                                                          | Prado       | CASTRELO DE MIÑO         | Ourense    | 41.1    |

| Táboa 2: Temperatura <u>máxima máis alta</u> rexistrada no verán de 2026<br><u>por riba</u> dos 1000 m de altitude |                 |                          |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|---------|
| Data                                                                                                               | Estación        | Concello                 | Provincia | TA (°C) |
| 18/08/2026                                                                                                         | Xurés           | MUIÑOS                   | Ourense   | 37.3    |
| 18/08/2026                                                                                                         | O Invernadeiro  | VILARIÑO DE CONSO        | Ourense   | 35.5    |
| 18/08/2026                                                                                                         | A Mezquita      | MEZQUITA (A)             | Ourense   | 35.0    |
| 06/07/2026                                                                                                         | San Xoán de Río | SAN XOÁN DE RÍO          | Ourense   | 34.4    |
| 18/08/2026                                                                                                         | Corzos          | VEIGA (A)                | Ourense   | 34.4    |
| 18/08/2026                                                                                                         | Ancares         | CERVANTES                | Lugo      | 33.8    |
| 23/06/2026                                                                                                         | Serra do Eixe   | VEIGA (A)                | Ourense   | 33.6    |
| 23/06/2026                                                                                                         | O Cebreiro      | PEDRAFITA DO CEBREIRO    | Lugo      | 33.4    |
| 18/08/2026                                                                                                         | Casaio          | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Ourense   | 32.3    |
| 23/06/2026                                                                                                         | O Xistral       | MURAS                    | Lugo      | 32.0    |



Doutra banda, nas **Táboas 3 e 4**, móstranse as temperaturas mínimas máis baixas rexistradas na Comunidade galega no verán de 2026 para as estacións situadas por riba e por baixo dos 1000 metros de altitude, respectivamente. Neste caso, sobresaí, por enriba de todo, o 5 de xuño como o día coas temperaturas nocturnas máis baixas, no que se formaron, localmente, **xeadas febles**.

**Táboa 3: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no verán de 2026 por riba dos 1000 m de altitude**

| Data       | Estación            | Concello                 | Provincia | TA (°C) |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------|
| 05/06/2026 | Cabeza de Manzaneda | MANZANEDA                | Ourense   | -0.8    |
| 05/06/2026 | Corzos              | VEIGA (A)                | Ourense   | -0.1    |
| 05/06/2026 | O Invernadeiro      | VILARIÑO DE CONSO        | Ourense   | 0.4     |
| 05/06/2026 | Lardeira            | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Ourense   | 0.5     |
| 05/06/2026 | Xares               | VEIGA (A)                | Ourense   | 0.8     |
| 05/06/2026 | O Cebreiro          | PEDRAFITA DO CEBREIRO    | Lugo      | 1.0     |
| 05/06/2026 | Alto do Poio        | PEDRAFITA DO CEBREIRO    | Lugo      | 1.4     |
| 05/06/2026 | Ancares             | CERVANTES                | Lugo      | 1.7     |
| 05/06/2026 | Serra do Eixe       | VEIGA (A)                | Ourense   | 2.2     |
| 05/06/2026 | Xurés               | MUÍÑOS                   | Ourense   | 3.3     |

**Táboa 4: Temperatura mínima máis baixa rexistrada no verán de 2026 por baixo dos 1000 m de altitude**

| Data       | Estación             | Concello         | Provincia  | TA (°C) |
|------------|----------------------|------------------|------------|---------|
| 05/06/2026 | Calvos               | CALVOS DE RANDÍN | Ourense    | -1.0    |
| 05/06/2026 | Mouriscade           | LALÍN            | Pontevedra | 0.6     |
| 05/06/2026 | Vilarmajor           | RODEIRO          | Pontevedra | 0.8     |
| 05/06/2026 | Baltar               | BALTAR           | Ourense    | 1.3     |
| 05/06/2026 | Sambreixo            | GUITIRIZ         | Lugo       | 1.4     |
| 05/06/2026 | Viana do Bolo        | VIANA DO BOLO    | Ourense    | 1.8     |
| 05/06/2026 | Melide               | MELIDE           | A Coruña   | 1.9     |
| 05/06/2026 | Xinzo                | XINZO DE LIMIA   | Ourense    | 2.3     |
| 05/06/2026 | Fragavella           | ABADÍN           | Lugo       | 2.5     |
| 05/06/2026 | Feiranova-Santaballa | VILALBA          | Lugo       | 2.8     |



## 2.2. Precipitación


No conxunto dos meses de xuño, xullo e agosto, pódese cualificar este **verán de 2026** como **seco**, cunha **cantidade media acumulada** de **94 L/m<sup>2</sup>** e unha **porcentaxe de precipitación** dun **22 % inferior** ao período climático de referencia.

En **xuño**, as precipitacións repartíronse de xeito irregular, xa que apenas tivemos a chegada de fronte atlánticas e a meirande parte delas tiveron un carácter convectivo, polo que, aínda que nalgúns puntos concretos choveu en exceso, a escaseza de chuvia foi predominante. Deste xeito, a **precipitación media acumulada** foi **25 L/m<sup>2</sup>**. Isto representa unha **porcentaxe de precipitación** un **50 % por debaixo** do normal, cualificándose o mes como **seco**.

No mes de **xullo**, as chuvias producíronse, novamente, dun xeito moi irregular, ao igual que no mes anterior, por mor da falla de influencias atlánticas. Pola contra, toda precipitación tivo un carácter convectivo, polo que vemos algúns puntos concretos nos que as tormentas deixaron cantidades superiores ás normais, pero a meirande parte da Comunidade tivo un importante déficit de precipitacións. Así, a **precipitación media** da serie rexional para Galicia foi **5 L/m<sup>2</sup>**, o que representa unha **anomalía** dun **86 % inferior** ao normal, resultando un mes **moi seco**.


O verán rematou cun mes de **agosto** no que a dúas borrascas que nos visitaron entre as xornadas do 23 e o 29 deixaron cantidades suficientes para superar os valores climáticos de agosto, que son pequenas, xa que estamos falando do segundo mes máis seco do ano. A **precipitación media** rexistrada no conxunto de Galicia foi **64 L/m<sup>2</sup>**, o que representa unha **porcentaxe** dun **73 % superior** ao normal, resultando, así, un mes **moi húmido**.

Na **Figura 3**, móstrase a **precipitación total acumulada** neste verán de 2026. O valor medio de precipitación para o conxunto de Galicia, a partir dos valores do mapa, foi 112 L/m<sup>2</sup>. Os valores máis altos rexistráronse no oeste e no suroeste da provincia da Coruña e en áreas das Serras do Courel e dos Ancares, con acumulados entre 150 e, localmente, algo máis de 200 L/m<sup>2</sup>. Os valores máis baixos rexistráronse na contorna da Depresión da Limia, con cantidades que se moven entre 40 e 60 L/m<sup>2</sup>.



**Figura 3:** Precipitación acumulada (mm) no verán de 2026.

Na **Figura 4**, móstrase o mapa da **anomalía de precipitación** en forma de porcentaxe con respecto aos valores normais calculados no período 1981-2010, sendo 100% a porcentaxe que representa a normalidade. Deste xeito, segundo os valores do mapa, a anomalía media de precipitación foi un 16 % inferior ao agardado. A distribución das porcentaxes é irregular, con áreas secas, normais ou húmidas nas catro provincias. Aínda así, pódese destacar a Baixa Limia e os vales dos ríos da Comarca de Valdeorras como as zonas coas anomalías positivas máis altas, que se moven entre un 30 e un 80 % por riba das cantidades normais, e as Serras Setentrionais, entre as Serras do Xistral e da Capelada, como as zonas coas anomalías negativas máis altas, cun déficit de precipitación entre o 40 e o 60 %.



**Figura 4:** Porcentaxe de precipitación acumulada con respecto á media climática no verán de 2026.



A **Táboa 5** contén unha lista das estacións meteorolóxicas que rexistraron a máxima cantidade de precipitación neste verán de 2026.

| Táboa 5: Precipitación máxima acumulada no verán de 2026 |                       |            |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Estación                                                 | Concello              | Provincia  | Precipitación (L/m²) |
| Cee-Brens                                                | CEE                   | A Coruña   | 227                  |
| Xesteiras                                                | CUNTIS                | Pontevedra | 207                  |
| Alto do Poio                                             | PEDRAFITA DO CEBREIRO | Lugo       | 202                  |
| Ancares                                                  | CERVANTES             | Lugo       | 200                  |
| Coto Muíño                                               | ZAS                   | A Coruña   | 198                  |
| Fornelos de Montes                                       | FORNELOS DE MONTES    | Pontevedra | 196                  |
| Fontecada                                                | SANTA COMBA           | A Coruña   | 190                  |
| Abradelo                                                 | SAMOS                 | Lugo       | 170                  |
| Muralla                                                  | LOUSAME               | A Coruña   | 170                  |
| Lira                                                     | CARNOTA               | A Coruña   | 166                  |


Pola contra, na **Táboa 6**, preséntase unha lista coas estacións meteorolóxicas que recolleron a cantidade mínima de precipitación no verán de 2026.

| Táboa 6: Precipitación mínima acumulada no verán de 2026 |                  |           |                      |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|
| Estación                                                 | Concello         | Provincia | Precipitación (L/m²) |
| Monte Medo                                               | BAÑOS DE MOLGAS  | Ourense   | 40                   |
| Lourenzá                                                 | LOURENZÁ         | Lugo      | 53                   |
| Punta Candieira                                          | CEDEIRA          | A Coruña  | 53                   |
| Baltar                                                   | BALTAR           | Ourense   | 54                   |
| Xinzo                                                    | XINZO DE LIMIA   | Ourense   | 54                   |
| Pazo de Fontefiz                                         | COLES            | Ourense   | 60                   |
| Larouco                                                  | LAROUCO          | Ourense   | 60                   |
| Gandarela                                                | CELANOVA         | Ourense   | 60                   |
| Calvos                                                   | CALVOS DE RANDÍN | Ourense   | 60                   |
| CIS Ferrol                                               | FERROL           | A Coruña  | 63                   |

### 3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DA TEMPERATURA E PRECIPITACIÓN DE VERÁN


#### 3.1. Temperatura

Na **Figura 5**, móstrase a evolución da **temperatura media** en verán desde o ano 1961. O valor medio da temperatura media do verán de 2026, obtido a partir da temperatura media das once estacións que compoñen a **serie rexional**, acadou un valor de **21.4 °C**.



**Figura 5:** Evolución da temperatura media (°C) no verán para a serie rexional galega desde 1961.

Así, a **anomalía da temperatura media** para Galicia, obtida a partir das anomalías medias en once estacións meteorolóxicas representativas e simbolizada na **Figura 6**, foi **2.3 °C superior** ao valor climático do período de referencia 1981-2010. Iso fai que, segundo os criterios da Táboa 0.2, se poida cualificar o verán de 2026 como **extremadamente cálido** e, mirando a serie histórica iniciada en 1961, como **o máis cálido de todos**. Para a media das temperaturas mínima e máxima, con desviacións positivas de 2.0 e 2.6 °C, respectivamente, o verán resulta, tamén, o máis cálido desde que existen rexistros.



**Figura 6:** Evolución da anomalía da temperatura media (°C) en verán respecto ao período de referencia 1981-2010.



A **Táboa 7** compara o valor da **temperatura media do verán de 2026** cos valores climáticos dos períodos de referencia 1971-2000 e 1981-2010. Así, vemos que o verán do ano 2026 amosa unhas anomalías positivas de 2.6 e 2.3 °C, respectivamente.

| Temperatura media verán (°C) |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 2026                         | 1971-2000 | 1981-2010 |
| 21.4                         | 18.8      | 19.1      |

**Táboa 7:** Comparación entre a temperatura media do verán 2026 e a media climática galega nos períodos de referencia mostrados.

Na **Táboa 8**, móstrase a **temperatura media dos meses de verán** e a comparación cos valores climáticos de referencia. Pódese concluír que, en canto á temperatura media e considerando o período de referencia 1981-2010, **xuño** e xullo considéranse **extremadamente cálidos**, sendo **xullo**, ademais, **o máis máis cálido desde que se teñen rexistros**, e **agosto moi cálido**.

| Temperatura media mensual (°C) |      |           |           |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| Mes                            | 2026 | 1971-2000 | 1981-2010 |
| xuño                           | 20.4 | 17.1      | 17.7      |
| xullo                          | 22.5 | 19.6      | 19.5      |
| agosto                         | 21.4 | 19.6      | 19.7      |

**Táboa 8:** Comparación entre a temperatura media dos meses de verán e as medias mensuais climáticas nos períodos de referencia mostrados.

Na **Táboa 9**, pódese observar a **temperatura media das mínimas** na estación de verán de 2026 e a comparación cos valores de referencia dos períodos 1971-2000 y 1981-2010. Tendo en conta os percentís das series das mínimas, este verán foi **o máis cálido desde que comezan a tomarse datos** en 1961, cunha anomalía positiva de 2.0 °C respecto ao último período de referencia.

| Temperatura media das mínimas en verán (°C) |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2026                                        | 1971-2000 | 1981-2010 |
| 15.2                                        | 12.9      | 13.2      |

**Táboa 9:** Comparación entre a temperatura mínima media no verán 2026 e a media climática galega nos períodos de referencia mostrados.

A escala mensual e comparando os datos co período de referencia 1981-2010, os meses de **xuño e agosto** resultaron **moi cálidos** e **xullo o máis cálido da serie histórica**.

| Temperatura media das mínimas por mes (°C) |      |           |           |
|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Mes                                        | 2026 | 1971-2000 | 1981-2010 |
| xuño                                       | 14.0 | 11.5      | 12.0      |
| xullo                                      | 15.9 | 13.6      | 13.8      |
| agosto                                     | 15.7 | 13.5      | 13.8      |

**Táboa 10:** Comparación entre a temperatura mínima media dos meses de verán e as medias mensuais climáticas nos períodos de referencia mostrados.



Na **Táboa 11**, pódese observar a **temperatura media das máximas** na estación de verán de 2026 e a comparación cos valores de referencia dos períodos 1971-2000 y 1981-2010. Tendo en conta os percentís das series das máximas, este verán foi **o máis cálido desde que comezan a tomarse datos** en 1961, cunha desviación positiva de 2.6 °C respecto ao último período de referencia.

| Temperatura media das máximas en verán (°C) |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2026                                        | 1971-2000 | 1981-2010 |
| 27.6                                        | 24.6      | 25.0      |

**Táboa 11:** Comparación entre a temperatura máxima media no verán 2026 e a media climática galega nos períodos de referencia mostrados.


Mensualmente e tomando como referencia o período 1981-2010, **xuño** resultou **o máis cálido da serie histórica**, **xullo extremadamente cálido**, pasando a ocupar a **segunda praza na serie de datos**, e **agosto cálido**.

| Temperatura media das máximas por mes (°C) |      |           |           |
|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Mes                                        | 2026 | 1971-2000 | 1981-2010 |
| xuño                                       | 26.7 | 22.8      | 23.4      |
| xullo                                      | 29.0 | 25.5      | 25.6      |
| agosto                                     | 27.1 | 25.7      | 26.0      |

**Táboa 12:** Comparación entre a temperatura máxima media dos meses do verán 2025 e as medias mensuais climáticas nos períodos de referencia mostrados.


### 3.2. Precipitación

Na **Figura 7**, pódese ver a evolución da **precipitación media acumulada** no verán desde o ano 1961. O valor medio da precipitación acumulada no verán de 2026, obtido a partir da precipitación media das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional, foi **94 L/m²**.



**Figura 7:** Evolución da precipitación media acumulada no verán para a serie rexional galega.

A **anomalía de precipitación**, obtida a partir das anomalías medias das dezaseis estacións que compoñen a serie rexional, foi un **22 % inferior á media climática** do período 1981-2010, o que fai que, segundo os criterios da Táboa 0.3, o verán de 2026 se poida considerar **seco**. O precedente máis seco atopámolo no verán do ano 2025.



**Figura 8:** Evolución da anomalía de precipitación en verán (%) respecto ao período de referencia 1981-2010



Na **Táboa 13**, móstranse, ademais do **valor medio de precipitación acumulada** no verán 2025, os valores climáticos dos períodos 1971-2000 e 1981-2010. A anomalía de precipitación neste verán foi un 22 % inferior ao valor normal do último período de referencia.

| Precipitación acumulada estacional (L/m <sup>2</sup> ) |           |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2026                                                   | 1971-2000 | 1981-2010 |
| 94                                                     | 121       | 123       |

**Táboa 13:** Comparación entre a precipitación media acumulada no verán 2026 e os valores climáticos.


O estudo mensual da precipitación media acumulada no verán de 2026, recollido na **Táboa 14**, amosa como resultado un mes de **xuño seco**, **xullo moi seco** e **agosto moi húmido**.

| Precipitación acumulada por mes (L/m <sup>2</sup> ) |      |           |           |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Mes                                                 | 2026 | 1971-2000 | 1981-2010 |
| xuño                                                | 25   | 53        | 51        |
| xullo                                               | 5    | 32        | 34        |
| agosto                                              | 64   | 37        | 38        |

**Táboa 14:** Comparación entre os valores acumulados de precipitación dos meses de verán e as medias correspondentes aos períodos climáticos.

## 4 DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

No diagrama de termohietas da estación de verán representado na **Figura 9**, no cal se collen **todos os datos da serie histórica** para o cálculo dos percentís non só o período 1981-2010, vemos cómo de extraordinario foi o verán de 2026 no que á temperatura media se refire, posto que o atopamos no extremo máis cálido ata o momento, sendo menos anómalo en canto á precipitación media acumulada, quedando, neste caso, moi preto e lixeiramente por riba do percentil 40 (pp40).



**Figura 9:** Diagrama de termohietas para a estación de verán desde 1961.

MeteoGalicia

Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático  
Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático  
Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático